

QUIMIOPROFILAXIS PARA INFECCIONES POR *HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B*

La quimioprofilaxis se recomienda en todos los contactos domiciliarios de niños y adultos cuando uno de los contactos tenga menos de 4 años de edad. No se recomienda si todos los contactos tienen más de 4 años.

Un contacto domiciliario es toda persona que resida en el domicilio del caso índice o primario, o aquellos que, no residiendo en el mismo de forma habitual hayan pasado cuatro o más horas diarias junto al paciente índice, en al menos 5 de los 7 días anteriores al ingreso del mismo en el hospital.

Los niños que han sido correctamente vacunados frente a *Haemophilus* no precisan profilaxis.

RIFAMPICINA

Guarderías: Se administrará profilaxis a todos los niños y personal supervisor cuando existan contactos menores de dos años, o bien, independientemente de la edad de los niños, cuando hayan aparecido 2 o más casos en un periodo de 60 días.

Embarazo: No se recomienda la profilaxis en mujeres embarazadas.

Dosificación de la Rifampicina:

- Niños: 20 mg/kg./día, 4 días, 1 sola toma diaria (dosis máxima 600 mg/día)
- Niños <1 mes: 10 mg/kg./día, 4 días, 1 toma diaria
- Adultos: 600 mg/día, 4 días, 1 sola toma diaria

La profilaxis debe iniciarse lo antes posible, ya que un 54% de los casos secundarios ocurren la primera semana tras la hospitalización del paciente.