

QUIMIOPROFILAXIS DE LA ENFERMEDAD MENINGOCOCICA.

Indicaciones:

- Personas que conviven en el mismo domicilio del enfermo.
- Niños que conviven en la misma clase de la escuela o de la guardería.
- Personas que hayan tenido contacto con las secreciones nasofaríngeas del enfermo (besos, compartir cubiertos comida o bebida).
- Personal sanitario en contacto directo con las secreciones nasofaríngeas del enfermo antes de iniciado el tratamiento antibiótico (respiración boca a boca, intubación, aspiración).

La profilaxis debe iniciarse lo antes posible (preferentemente en las primeras 24 horas tras la identificación del caso).

ANTIBIÓTICOS RECOMENDADOS Y DOSIS:

RIFAMPICINA (fármaco de elección):

- Adultos : 600 mg./ 12 h. Durante 2 días
- Niños: 10 mg/kg/12 horas durante 2 días.(dosis máxima 600 mg/12 horas)
- Niños < 1 mes: 5 mg/kg/12 horas durante 2 días.

La Rifampicina no se debe administrar en casos de:

- Alergia a la misma.
- Interacciones con otros fármacos (anticonceptivos orales, anticoagulantes orales).
- Mujeres gestantes.
- Hepatopatía grave.

CEFTRIAXONA.

- Niños: 125 mg intramuscular, 1 dosis.
- Adultos: 250 mg intramuscular, 1 dosis.

- Segura en mujeres embarazadas

MINOCILINA

(Sólo en niños mayores de 9 años y adultos, contraindicada en mujeres embarazadas)

- Adultos : 200 mg (1ª dosis), seguir con 100 mg/12 horas, 5 dosis.
- Niños: 4 mg/Kg (1ª dosis), seguir con 2 mg/Kg/12 horas, 5 dosis.

CIPROFLOXACINO

Sólo en adultos dosis única de 500 mg. Contraindicada en embarazadas. Un consenso reciente acepta el uso de Ciprofloxacino en niños cuando no hay otras alternativas aceptables.