

QUINUPRISTINA-DALFOPRISTINA

GRUPO FARMACOLOGICO: Estrteptograminas. Grupo Terapéutico: J01FG.

PRESENTACIÓN:

Synercid vial 350/150 mg .
Almacenar en nevera (+2°C a +8°C)

RECONSTITUCIÓN:

Reconstituir el vial monodosis por adición lenta de 5 ml de agua p.i. o SG5%. Mover suavemente hasta disolución (2 minutos), evitando la formación de espuma. Dejar reposar la solución hasta que desaparezca la espuma. La concentración final será de 100 mg/ml.
Estabilidad del vial reconstituido 30 min.

ADMINISTRACIÓN

INYECCIÓN IV DIRECTA: NO.

INFUSIÓN INTERMITENTE: SÍ.

Extraer del vial reconstituido la cantidad de solución según peso del paciente (7,5 mg/Kg) y reconstituir con:

- si administración venosa central: 100 ml de G 5%.
- si administración venosa periférica: 250 ml de G 5%.

Estabilidad tras preparar solución para perfusión: 5 horas a T^a ambiente o 24 horas a 2-8 ° C.

INFUSIÓN CONTÍNUA: NO.

INYECCIÓN IM: NO.

SUEROS COMPATIBLES: SG 5%. **No** con SF.

OBSERVACIONES:

Si se administra con otro medicamento debe darse por separado. Si la misma vía se emplea para dos medicamentos, lavar con SG 5%.

Sólo puede administrarse en Y con:

aztreonam 20 mg/ml, ciprofloxacina 1 mg/ml, haloperidol 0,2 mg/ml, metoclopramida 5 mg/ml, clorhidrato de morfina 1 mg/ml y cloruro potasio 40 mmol/l y utilizado como solución no diluida con fluconazol 2 mg/m.

(Ficha técnica Marzo 2000).