Evaluación económica

Son Espases
hospital universitari

Dr. Pere Ventayol

EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN ESPAÑA

Organización.- Responsabilidades compartidas

GOBIERNO CENTRAL	C.C.A.A.
• Legislación básica. • Financiación. • Ordenación prestaciones. • Política farmacéutica • Salud Internacional. • Formación Sanitaria. • Coordinación General (C.I.SNS)	• Planificación Sanitaria. • Ordenación Territorial. • Salud Pública. • Gestión Sanitaria.

CCAA

Fragmentación de la decisión

Stakeholders

Médico
Prescribe
No consume
No paga



Paciente
Consume
No paga
No prescribe

Administración
Paga
No prescribe
No consume

Decisor
No paga
No prescribe
No consume

Año 2009

GASTO SANITARIO PÚBLICO 6,5 % del PIB

65.150 millones de euros

Composición porcentual según clasificación funcional

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Estadísticas del Gasto Sanitario Público

el 97% de los medicamentos que se autorizan se financian





Introducción

LA DEMANDA ES INFINITA

LOS RECURSOS SON LIMITADOS

3

Consideraciones

1

Las Agencias Reguladoras
NO resuelven
cual es el lugar en la terapéutica de un nuevo fármaco

2

El mercado farmacéutico no está regulado por criterios científicos o de salud

La oferta…la crea la industria farmacéutica

…el sistema sanitario y los profesionales (como mucho) la modulan.



Tendencia actual



Tipos evaluaciones económicas

	Efectos sobre recursos	Efectos sobre salud
Minimización de costes	€	Similares
Coste-efectividad	€	unidades de efectividad
Coste-utilidad	€	AVAC
Coste-beneficio	€	€

Farmacia HOSPITALARIA
www.elsevier.es/farmhosp
ORIGINAL

Evaluación económica de intervenciones en enfermedades oncológicas en España: revisión sistemática y análisis comparativo

F. Catalá-López[a,b,*], A. García-Altés[a,c], E. Álvarez-Martín[a], R. Génova-Maleras[a], C. Morant-Ginestar[a] y E. Arana[a,d]

Tabla 2 Evolución del número de estudios de evaluación económica sobre enfermedades oncológicas publicados en España

	Período					
Tipo de estudios	1983-1988	1989-1993	1994-1998	1999-2003	2004-2008	1983-2008
ACB	0	0	0	1	2	3
ACE	0	3	5	16	14	38
ACU	0	0	0	1	6	7
AMC	0	0	1	6	8	15
Totales	0	3	6	24	30	63

ACB: análisis coste-beneficio; ACE: análisis coste-efectividad; ACU: análisis coste-utilidad; AMC: análisis de minimización de costes.

Tipos de COSTES



De morbilidad
De mortalidad

Suponen perdida de bienestar para el individuo
Dificil expresarlos en €
Impacto medido a través de los estudios de CVRS

Tipos de COSTES

Perspectiva:

Sociedad vs Autoridades sanitarias (sistema de salud)

Coste del fármaco
Costes asociados relevantes
Coste tratamiento Ef. Sec.
Hospitalización
Cuidadores

Horizonte temporal:

Período mayor al de los ensayos clínicos: extrapolación.
En enfermedades crónicas, no hay consenso

Tasas de descuento

Mark Nuijten, Dominique Dubois. Gerry Oster The appropriateness of the cost per QUALY in the decision-making process. Presentación ppt. Madrid, Spain. November 5-8, 2011

Ejemplo estudio farmacoeconómico costes

New Protease Inhibitors for the Treatment of Chronic Hepatitis C
A Cost-Effectiveness Analysis

Cost (2010 U.S. dollars), $	
Age-specific baseline health care costs	
IL-28B testing	371 (186 to 557)
Treatment (drug and medical care)	
PEG-INF+Rb (F0 to F3, 48 wk)	32 692 (12 002 to 49 460)
PEG-INF+Rb (F4, 48 wk)	35 814 (15 123 to 52 582)
PIs (per week)‡	1100 (781 to 1430)
AEs, standard therapy	1920 (1344 to 2496)
AEs, standard therapy, PI	2586 (1810 to 3361)
Retreatment (48 wk)§	83 677 (48 176 to 115 742)
Annual care‖	
HCV mild fibrosis (F0, F1)	1404 (152 to 4194)
HCV portal fibrosis (F2)	1404 (152 to 4194)
HCV bridging fibrosis (F3)	1404 (152 to 4194)
Compensated cirrhosis (F4)	4194 (152 to 4194)
Decompensated cirrhosis	11 109 (5560 to 16 669)
HCC	44 224 (22 117 to 66 341)
Liver transplant, first year	145 640 (72 825 to 218 455)
Liver transplant, subsequent	25 430 (12 715 to 38 156)
Recovered states from F0 to F3	406 (0 to 702)
Recovered states from F4	811 (0 to 2097)

Medida de la efectividad:

EFECTIVIDAD:

-Positivas:

Ej: Curaciones, AVG

-Negativas:

Ej: Evitar eventos perjudiciales

UTILIDAD:

-AVAC

Medida de la efectividad: AVAC

Efecto sobre la salud en análisis coste-utilidad

La efectividad se ajusta por **calidad de vida**:

AVAC Años de vida ajustados por calidad de vida

AVAC = Años de vida ganado x factor

↓

Calidad de vida

Efecto sobre la salud en análisis coste-utilidad

Si existen diferentes estados de salud consecutivos (1, 2, ..., n)

$$AVAC = AV_1 U_1 + AV_2 U_2 + ...+ AV_n U_n$$

AV = Años de vida en ese determinado estado de salud

U = utilidad en ese estado de salud

Las diferencias de efectividad de dos tratamientos depende de dos factores:

1-AV ganados: Diferencia en AV entre el tratamiento A y el B

2-Utilidades: Estado de salud en que se vive este AV ganado

Utilidades o preferencias

Métodos de estimación de preferencias

•Utilizados en evaluaciones económicas.

•Utilidad o preferencia: "utilidad es una medida de la preferencia relativa por un efecto o estado que proporciona un resumen de los aspectos positivos y negativos de la calidad de vida"

•Valor de 0 a 1 } O: peor escenario (muerte)
1: mejor escenario (salud perfecta)

•2 tipos:

Métodos indirectos: se valora el estado del paciente y luego se asigna el valor de utilidad.

Métodos directos: se miden directamente las preferencias del sujeto.

Métodos de estimación de preferencias

Métodos indirectos:

- Cuestionario se valora el estado del paciente.
- Se transforma el estado de salud en un valor único **(utilidad)** mediante una fórmula.
- Previamente, valorados en una muestra de la población para asignar a qué valores de utilidad corresponden cada uno de los estados de salud.

Ej:

Health Utilities Index, Quality of Well-Being, EuroQol.

EQ-5D-3L EQ-5D-5L

Short-Form 36 Health Survey (SF-36)

SF-36 SF-D

Euro Qol EQ-5D-3L



Anexo 1: Cuestionario EQ-5D

Marque con una cruz la respuesta de cada apartado que mejor describa su estado de salud en el día de HOY.

Movilidad
- No tengo problemas para caminar
- Tengo algunos problemas para caminar
- Tengo que estar en la cama

Cuidado Personal
- No tengo problemas con el cuidado personal
- Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme
- Soy incapaz de lavarme o vestirme

Actividades Cotidianas (ej., trabajar, estudiar, hacer las tareas domésticas, actividades familiares o actividades durante el tiempo libre)
- No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas
- Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas
- Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas

Dolor/Malestar
- No tengo dolor ni malestar
- Tengo moderado dolor o malestar
- Tengo mucho dolor o malestar

Ansiedad/Depresión
- No estoy ansioso/a ni deprimido/a
- Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a
- Estoy muy ansioso/a o deprimido/a



Para ayudar a la gente a describir lo bueno o malo que es su estado de salud hemos dibujado una escala parecida a un termómetro en el cual se marca con un 100 el mejor estado de salud que pueda imaginarse y con un 0 el peor estado de salud que pueda imaginarse.

Nos gustaría que nos indicara en esta escala, en su opinión, lo bueno o malo que es su estado de salud en el día de HOY. Por favor, dibuje una línea desde el casillero donde dice «Su estado de salud hoy» hasta el punto del termómetro que en su opinión indique lo bueno o malo que es su estado de salud en el día de HOY.

Su estado de salud hoy

El mejor estado de salud imaginable

100
90
80

Euro Qol EQ-5D-3L

Calculadora de utilidades : http://www.economicsnetwork.ac.uk/health/EQ_5D_index_calculator.xls



EQ-5D index calculator

This model estimates the EQ-5D index score for a given health state defined by the user. Index scores are based on general population valuation surveys that used TTO or VAS methods in various countries as presented in the book: Szende, Oppe, Devlin (ed.) EQ-5D Value Sets: Inventory, comparative review and user guide.

Please enter health state description:

Mobility	2
Self-Care	2
Usual activities	2
Pain/Discomfort	2
Anxiety/Discomfort	2

Select country/survey of interest: Spain

	TTO Score	VAS Score
Spain	0.514	0.493

Results for all countries/surveys:

	TTO Score	VAS Score
Belgium	Not available	0.473
Denmark	0.592	0.394
Finland	Not available	0.368
Germany	0.701	0.495
Japan	0.532	Not available
Netherlands	0.559	Not available
New Zealand	Not available	0.464
Slovenia	Not available	0.315

Euro Qol 5D-5L



The EQ-5D-5L descriptive system should be scored, for example, as follows:

Under each heading, please tick the ONE box that best describes your health TODAY

MOBILITY
I have no problems in walking about
I have slight problems in walking about
I have moderate problems in walking about
I have severe problems in walking about
I am unable to walk about

SELF-CARE
I have no problems washing or dressing myself
I have slight problems washing or dressing myself
I have moderate problems washing or dressing myself
I have severe problems washing or dressing myself
I am unable to wash or dress myself

USUAL ACTIVITIES (e.g. work, study, housework, family or leisure activities)
I have no problems doing my usual activities
I have slight problems doing my usual activities
I have moderate problems doing my usual activities
I have severe problems doing my usual activities
I am unable to do my usual activities

PAIN / DISCOMFORT
I have no pain or discomfort
I have slight pain or discomfort
I have moderate pain or discomfort
I have severe pain or discomfort
I have extreme pain or discomfort

ANXIETY / DEPRESSION
I am not anxious or depressed
I am slightly anxious or depressed
I am moderately anxious or depressed
I am severely anxious or depressed
I am extremely anxious or depressed

Levels of perceived problems are coded as follows:

Level 1 is coded as '1'

Level 2 is coded as '2'

Level 3 is coded as '3'

Level 4 is coded as '4'

Level 5 is coded as '5'

This example identifies the health state '12345'.

NB: There should be only ONE response for each dimension

NB: Missing values can be coded as '9'.

NB: Ambiguous values (e.g. 2 boxes are ticked for a single dimension) should be treated as missing values.

This EQ VAS should be scored, for example, as follows:

- "We would like to know how good or bad your health is TODAY.
- This scale is numbered from 0 to 100.
- 100 would mean the best health you can imagine.
- 0 would mean the worst health you can imagine.
- Mark an X on the scale to indicate how good or bad your health is TODAY.
- Now, please write the number you marked on the next box.

YOUR HEALTH TODAY = 77

For example, this response would be coded as 77

NB: Missing values should be coded as '999'.

NB: If there is a discrepancy between where the respondent has placed the X and the number he/she has written in the box, clarification should take the number in the box.

SF 6D (SF-36)

Tabla 4. El sistema de clasificación de estados de salud SF-6D(SF-36). Brazier et al. (2002)

Nivel	Funcionamiento físico	Limitaciones de rol	Funcionamiento social	Dolor	Salud mental	Vitalidad
1	Su salud no le limita para realizar esfuerzos intensos (p.ej. correr, levantar objetos pesados, participar en deportes agotadores).	No tiene problemas con su trabajo u otras actividades cotidianas a causa de su salud física o de sus problemas emocionales.	Su salud no le dificulta sus actividades sociales (como visitar a amigos o familiares) en ningún momento.	No tiene dolor.	Nunca se siente muy nervioso o desanimado y deprimido.	Tiene mucha energía siempre.
2	Su salud le limita un poco para realizar esfuerzos intensos (p.ej. correr, levantar objetos pesados, participar en deportes agotadores).	Ha dejado de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud física.	Su salud le dificulta sus actividades sociales (como visitar a amigos o familiares) sólo alguna vez.	Tiene dolor pero no interfiere con su trabajo habitual (fuera de casa o en las tareas del hogar).	Se siente muy nervioso o desanimado y deprimido sólo alguna vez.	Tiene mucha energía casi siempre.
3	Su salud le limita un poco para realizar esfuerzos moderados (p.ej. mover una mesa, pasar la aspiradora o caminar más de 1 hora).	Hace menos de lo que quisiera hacer a causa de sus problemas emocionales.	Su salud le dificulta sus actividades sociales (como visitar a amigos o familiares) algunas veces.	Tiene dolor que interfiere un poco con su trabajo habitual (fuera de casa o en las tareas del hogar).	Se siente muy nervioso o desanimado y deprimido algunas veces.	Tiene mucha energía algunas veces.
4	Su salud le limita mucho para realizar esfuerzos moderados (p.ej. mover una mesa, pasar la aspiradora o caminar más de 1 hora).	Ha dejado de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud física y hace menos de lo que quisiera hacer a causa de sus problemas emocionales.	Su salud le dificulta sus actividades sociales (como visitar a amigos o familiares) casi siempre.	Tiene dolor que interfiere moderadamente con su trabajo habitual (fuera de casa o en las tareas del hogar).	Se siente muy nervioso o desanimado y deprimido casi siempre.	Tiene mucha energía sólo alguna vez.
5	Su salud le limita un poco para bañarse o vestirse por sí mismo.		Su salud le dificulta sus actividades sociales (como visitar a amigos o familiares) siempre.	Tiene dolor que interfiere bastante con su trabajo habitual (fuera de casa o en las tareas del hogar).		Nunca tiene mucha energía.
6	Su salud le limita mucho para bañarse o vestirse por sí mismo.			Tiene dolor que interfiere mucho con su trabajo habitual (fuera de casa o en las tareas del hogar).		

Utilidades SF-6D para Reino Unido (Brazier et al.)

Métodos de estimación de preferencias

Métodos directos:

- Juego estándar.
- Equivalencia temporal.
- Escala de categorías o escala visual analógica.

Juego estándar

Figura 3. Juego estándar.



Considera probabilidades e incertidumbre.

Ventajas: se asemeja a la realidad.

Desventajas: difícil de comprender y posible contaminación de los valores U_i por aversión/atracción al riesgo del encuestado.

Métodos de estimación de preferencias

Escala de categorías

Figura 4. Escala de categorías.

Todos los posibles estados de salud intermedios son situados por los encuestados en los diferentes intervalos de manera que corresponden con sus preferencias.

Ventajas: senzillez y proporciona una medida de fuerza de las preferencias.
Desventajas:
- supone que la diferencia entre 0,2 y 0,3 es la misma que entre 0,8 y 0,9.
- efectos contextuales.

Equivalencia temporal

Se busca el mínimo tiempo x en estado de buena salud por el cual el entrevistado estaría dispuesto a cambiar un tiempo t en el estado de salud i.

Ventajas: fácil de entender y considera duración y calidad de vida.
Desventajas: puede no reflejar de manera real las situaciones de decisión de un individuo por un tratamiento que implica incertidumbre.

Figura 5. Equivalencia temporal.



Ejemplo estudio farmacoeconómico

Utilidades

ORIGINAL RESEARCH | New Protease Inhibitors for the Treatment of Chronic Hepatitis C

Table 2. **Utilities and Costs**

Variable	Base Case (Range)
Quality of life*	
Age-specific QALY weights	
HCV-specific weights	
HCV mild fibrosis (F0, F1)	0.980 (0.700 to 1.000)
SVR after mild fibrosis	1.000 (0.740 to 1.000)
HCV moderate fibrosis (F2, F3)	0.850 (0.660 to 1.000)
SVR after moderate fibrosis	0.933 (0.710 to 1.000)
Compensated cirrhosis (F4)	0.790 (0.460 to 1.000)
SVR after cirrhosis	0.933 (0.600 to 1.000)
Decompensated cirrhosis	0.720 (0.257 to 0.913)
HCC	0.720 (0.150 to 0.950)
Liver transplant (during or after)	0.825 (0.636 to 1.000)
Standard therapy annualized decrement†	−0.110 (−0.200 to 0.000)
Triple therapy annualized decrement†	−0.165 (−0.400 to 0.000)
Liver transplant annualized decrement†	−0.200 (−0.364 to 0.000)

Modelización

Arboles de decisión, modelos de Markov,…


Annals of Internal Medicine | ORIGINAL RESEARCH

New Protease Inhibitors for the Treatment of Chronic Hepatitis C

A Cost-Effectiveness Analysis

Figure 1. Model schematics.

Cohort Characteristics

Decision Alternatives for Each Cohort Type

Standard therapy

Universal triple therapy

IL-28B–guided triple therapy

Markov Model

Dead

All States

HCC

Liver transplant

After liver transplant

No HCV

No fibrosis (F0)

Coste efectividad incremental

Dos alternativas: Tratamiento estandar tratamiento y nuevo

Coste efectividad incremental CEI (ICER)

ANÁLISIS FARMACOECONÓMICO

Tipo de análisis	Efectos sobre los recusos	Efectos sobre la salud
Coste - efectividad	Unidades monetarias Valoración de costes Dinero	Medicamentos que consiguen resultados únicos de la misma magnitud, valorando pacientes controlados, años de vida ganados...

$$ICE = \frac{C_{NT} - C_{TE}}{E_{NT} - E_{TE}}$$

(C_{NT} = Coste nuevo tratamiento)
(C_{TE} = Coste tratamiento estándar)
(E_{NT} = Efectividad nuevo tratamiento)
(E_{TE} = Efectividad tratamiento estándar)

*Coste efectividad incremental expresado en AVACs (**Utilidades**)*

Ejemplo:

	Supervivenci	Calidad de	AVAC
Tratamiento A	8	0,5	4,0
Tratamiento B	5	0,9	4,5

Coste efectividad incremental (ICER) – Coste/AVG

	Supervivencia	Calidad de vida	AVAC	Coste total	ICER
Tratamiento	8	0,5	4,0	1000	
Tratamiento	5	0,9	4,5	1500	
Diferencia			0,5	500	1000

Ejemplo estudio farmacoeconómico

Beneficios sobre la salud



New Protease Inhibitors for the Treatment of Chronic Hepatitis C

A Cost-Effectiveness Analysis

Table 3. Lifetime Discounted Costs and Health Benefits of Treatment Strategies, by Severity of Fibrosis Stage*

Strategy	SVR, %	Lifetime Risk, %			Cost, $	QALYs	ICER, $/QALY	ICER Excluding IL-28B, $/QALY†
		Decompensated Cirrhosis	HCC	Liver Transplant				
Base case (boceprevir scenario)								
Mild fibrosis‡								
Standard therapy	38	8.4	4.7	1.5	160 456	10.97	–	–
IL-28B–guided triple therapy	67	5.7	3.2	1.0	177 152	11.24	62 900	–
Universal triple therapy	61	5.1	2.9	0.9	183 257	11.30	102 600	70 100
Advanced fibrosis§								
Standard therapy	32	23.0	13.2	4.6	161 312	8.84	–	–
IL-28B–guided triple therapy	48	17.6	10.1	3.6	179 090	9.38	32 800	–
Universal triple therapy	51	16.5	9.5	3.3	185 447	9.51	51 500	36 300
Telaprevir scenario								
Mild fibrosis‡								
Standard therapy	38	8.4	4.7	1.5	160 456	10.97	–	–
IL-28B–guided triple therapy	63	4.9	2.8	0.9	191 559	11.33	86 800	–
Universal triple therapy	70	3.9	2.2	0.7	203 285	11.44	102 400	91 000
Advanced fibrosis§								
Standard therapy	32	23.0	13.2	4.6	161 312	8.84	–	–
IL-28B–guided triple therapy	54	15.9	9.1	3.2	193 805	9.56	45 300	–
Universal triple therapy	60	14.4	8.0	2.8	206 010	9.78	54 100	47 400

HCC = hepatocellular carcinoma; ICER = incremental cost-effectiveness ratio; IL-28B = interleukin-28B; QALY = quality-adjusted life-year; SVR = sustained virologic response.

* Results are weighted averages over race and sex and are based on relative prevalence of these groups for patients with chronic hepatitis C virus from NHANES III (Third National Health and Nutrition Examination Survey) data (white male, 51%; white female, 23%; black male, 17%; and black female, 9%).

† If IL-28B genotyping is unavailable, ICER compares universal triple therapy with standard therapy.

‡ F0, 30%; F1, 41%; and F2, 29%.

§ F2, 29%; F3, 23%; and F4, 48%.

Importancia del Análisis de sensibilidad

Consiste en el cálculo de los resultados bajo diversas hipótesis en cuanto al valor de las variables o parámetros inciertos.

Implica tres pasos:

- IDENTIFICAR parámetros con incertidumbre

- IDENTIFICAR el posible RANGO de valores.

- CALCULAR los resultados con los diferentes valores

Otras alternativas

<u>Análisis de diferentes escenarios:</u> basal, peor y mejor

Ejemplo estudio farmacoeconómico

Discrepancias en las utilidades

New Protease Inhibitors for the Treatment of Chronic Hepatitis C
A Cost-Effectiveness Analysis

Appendix Table 11. **Summary of HCV Health State Utility in the Literature**

Variable	McLernon and colleagues (37)*	Sherman and colleagues (35)	Chong and colleagues (36)	Grieve and colleagues (34)	Salomon and colleagues (15)	Current Analysis†
Estimation method‡	TTO	TTO	SG	EQ-5D	SG	
HCV health states						
HCV mild fibrosis (F0, F1)§	NA	0.85	0.79	0.77	0.98	0.98
During standard therapy	NA	NA	NA	0.66‖	NA	0.87
SVR after mild fibrosis	NA	NA	0.86	0.82	NA	1.00
HCV moderate fibrosis (F2, F3)	0.863	0.85	0.79	0.66	0.92	0.85
During standard therapy	NA	NA	NA	NA	NA	0.74
SVR after moderate fibrosis	NA	NA	0.86	NA	NA	0.933¶
Compensated cirrhosis (F4)	0.864	0.79	0.8	0.55	0.82	0.79
During standard therapy	NA	0.86	NA	NA	NA	0.68
SVR after cirrhosis	NA	NA	0.86	NA	NA	0.933¶
Decompensated cirrhosis	0.788	0.72	0.6	0.45	0.58	0.72
HCC	NA	NA	0.72	0.45	0.55	0.72
After liver transplant	0.825	0.81	0.73	0.45	0.86	0.825

EQ-5D = EuroQol-5D; HCC = hepatocellular carcinoma; HCV = hepatitis C virus; NA = not available; SG = standard gamble; SVR = sustained virologic response; TTO = time tradeoff.
* Numbers were estimated using formula and conversion factors provided for TTO in Table 4 of McLernon and colleagues (37).
† The quality-of-life weight for a given age and HCV disease state is computed as the product of the mean age-specific quality weight obtained from published data (32, 33) and the utility associated with the HCV disease state in the model.
‡ Health state utilities can be measured directly by using such methods as TTO and the SG, measured indirectly by using health state classification systems, such as EQ-5D, or estimated from health care experts.
§ In both Sherman and colleagues (35) and Chong and colleagues (36), mild HCV and moderate HCV health states were combined in the same category.
‖ In Grieve and colleagues (34), they assumed a disutility of 0.11 during HCV treatment.
¶ Converting 0.86 from SG in Chong and colleagues (36) to TTO equivalent measure using formula from McLernon and colleagues (37): 0.86 + (0.116 – 0.043) = 0.933.

Coste-efectividad incremental

Coste-efectividad incremental

$$\frac{CA - CB}{EA - EB}$$





Coste-utilidad:

valor Umbral AVAC?

«Presentar un EC sin evaluación económica es como un escaparate sin precios»

Smith R. BMJ 2002; 325: 1124

lunes, 24 de febrero de 2014

El valor y el precio: sofosbuvir

Coste de Adquisición Mayorista (WAC) 28.000 dólares USA el envase de 28 comprimidos, es decir **1000 dólares cada pastilla**, en euros, **728 euros cada pastilla**.

PRECIO BASADO EN LOS COSTES

PRECIO BASADO EN EL VALOR

(*Value-based pricing*)

A Secret Revealed: Why Drugs Cost What They Do

By Jessica Wapner
Posted: April 20, 2011

Few are the people who have not wondered why drugs cost what they do and, when the price tag has a pinch, sighed with exasperation. We've all read countless reports on the time- and resource-consuming labor of research and development (PDF). Elaborate studies have been done to count up (and debunk) all the dollars spent on creating new drugs. Even reports enumerating all the various pharma expenses still explain the price of prescription drugs by looking at what companies spend. And we've all read (or had our own) complaints: if only drug companies would advertise less, the price would go down. If only drug companies stopped wining and dining physicians, the price would go down. If only CEOs weren't so greedy. But here's the thing: none of this explains the price of medications.

So what is the great, big secret about why drugs cost what they do? Read on.

Drugs cost what the market will bear. It's that simple. Drug prices are set at whatever the market will bear.

So what does that mean? It means that if no one purchased a drug that cost $X, then the price would be lowered. Prices are set at exactly—and I mean *exactly*—at what the consumer/insurance infrastructure is able to carry.

"Sólo el necio confunde valor y precio"

Antonio Machado

Asignación de precios a los nuevos medicamentos de acuerdo con en el valor que ofrecen a la sociedad

Husereau D, Cameron C (2011). *Value-Based Pricing of Pharmaceuticals in Canada: Opportunities to Expand the Role of Health Technology Assessment? Paper 5.* Canadian Health Services Research Foundation.

PRECIO BASADO EN EL VALOR

(***Value-based pricing***)

AÑOS DE VIDA GANADOS

(AVG, LYG)

AÑOS DE VIDA AJUSTADOS POR CALIDAD

(AVAC, QALY)

20.000-30.000£/AVAC

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

National Institute for Health and Clinical Excellence (2008a). Guide to the Methods of Technology Appraisal. London, United Kingdom.

50.000 – 100.000 $/AVAC

Basado en el estándar: coste anual de diálisis supuesto para los pacientes con insuficiencia renal crónica. Desde 1982 (¡no ajustes por inflación!)

20.000-100.000 $ CAN/AVAC

Laupice et al. Canadá 1990.

50.000 - 80.000 €/AVAC

Quantification of the Potential Impact of Cost-effectiveness Thresholds on Dutch Drug Expenditures Using Retrospective Analysis. Value in Health. Volume 13, Num6 (2010)

500.000 SEK/AVAC

A Comparison of Benefit Cost and Cost Utility Analysis in Practice: Divergent Policies in Sweden LARS HULTKRANTZ AND MIKAEL SVENSSON . Karlstad University Working Papers in Economics 2012 / 1

REVISIÓN

¿Qué es una tecnología sanitaria eficiente en España?

J.A. Sacristán[a], J. Oliva[b,c], J. Del Llano[c], L. Prieto[a] y J.L. Pinto[d]
[a]Departamento de Investigación Clínica, Lilly S.A. Madrid.
[b]Fundación Gaspar Casal. Madrid.
[c]Universidad Carlos III. Madrid.
[d]Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.

Correspondencia: José Antonio Sacristán. Dpto. de Investigación Clínica, Lilly S.A. Avda. de la Industria, 30. 28108 Alcobendas. Madrid.
Correo electrónico: sacristan_jose@lilly.com

Recibido: 12 de noviembre de 2001.
Aceptado: 25 de enero de 2002.

Gac Sanit 2002;16(4):334-43

Coste-efectividad < 30.000 €/AVG

*Coste efectividad incremental expresado en AVACs (**Utilidades**)*

Ejemplo:

	Supervivenci	Calidad de	AVAC
Tratamiento A	8	0,5	4,0
Tratamiento B	5	0,9	4,5

Coste efectividad incremental (ICER) – Coste/AVAC

	Supervivencia	Calidad de vida	AVAC	Coste total	ICER
Tratamiento	8	0,5	4,0	1000	
Tratamiento	5	0,9	4,5	1500	
Diferencia			0,5	500	1000

ORIGINAL RESEARCH

Economic Savings Versus Health Losses: The Cost-Effectiveness of Generic Antiretroviral Therapy in the United States

Rochelle P. Walensky, MD, MPH; Paul E. Sax, MD; Yoriko M. Nakamura, BA; Milton C. Weinstein, PhD; Pamela P. Pei, PhD; Kenneth A. Freedberg, MD, MSc; A. David Paltiel, PhD; and Bruce R. Schackman, PhD

Ann Intern Med. 2013;158:84-92.

Table 2.. Clinical Outcomes, Cost, and Cost-Effectiveness of Generic-Based Versus Branded ART in the United States

Variable	Per-Person Cost, 2009 U.S. $	Per-Person Life Expectancy, QALY		ICER, $/QALY
		Discounted	Undiscounted	
Base case				
No ART	131 200	4.05	4.58	–
3-pill, generic-based ART	300 300	12.08	18.36	21 100
Branded ART*	342 800	12.45	19.32	114 800
Base case, including 2-pill, generic-based ART				
No ART	131 200	4.05	4.58	–
3-pill, generic-based ART	300 300	12.08	18.36	21 100
2-pill, generic-based ART	316 100	12.25	18.73	95 400
Branded ART*	342 800	12.45	19.32	130 600

ART = antiretroviral therapy; ICER = incremental cost-effectiveness ratio; QALY = quality-adjusted life-year.
* ICER for branded ART vs. no ART is $25 200/QALY.



Criterios para situaciones terminales "End-of-life" (EoL)

El NICE acepta un umbral superior al resto de tecnologías (enero 2009):

40.000-50.000£*

Criterios EoL: **(50.000-62.000 €)**

-Esperanza de vida de los pacientes a tratar < 24 meses.

-Aumento de la supervivencia > 3 meses.

-Inexistencia de tratamientos alternativos.

-Grupo de pacientes a tratar reducido (< 7.000 pacientes/año).

*Financiación específica del NHS: fondo complementario de 200 millones de £ anuales *Cancer Drugs Fund*.

El AVAC relativo

"The rationale behind this approach is simply that society cares about the absolute loss of quality of life and duration of illnesses. That is, larger losses of quality of life are more important than smaller losses. Longer durations of disease are more important than shorter durations of disease. Diseases which cause very premature death are more important than those which cause less premature death."

jueves, 10 de abril de 2014

El NICE realiza una consulta para cambiar los métodos de evaluación de tecnologías sanitarias y el "famoso" umbral de £30,000

Recientemente, el **Instituto Nacional para la Excelencia Clínica (NICE** por sus siglas en Inglés) ha presentado un documento de consulta para introducir cambios en sus **métodos de valoración de tecnologías sanitarias**. Entre las propuestas, se menciona la revisión de algunos parámetros de la fórmula que se utiliza para decidir cuáles medicamentos son financiados por el sistema sanitario del **Reino Unido**.

Esta nueva propuesta también introduce una recomendación para replantear el techo monetario por **Año de Vida Ajustado por Calidad** (AVAC) ganado, que se encuentra ahora entre las **£20,000 y £30,000**. La recomendación es elevar el límite superior, de manera que el nuevo rango se ubique entre las **£20,000 y £50,000 por AVAC ganado**.

El AVAC relativo

NICE technology appraisal	GENERAL CONDITION INPUTS: Disease code (ICD)	GENERAL CONDITION INPUTS: International classification of diseases (ICD)	Data from the Technology Appraisal: Average age	Data from the Technology Appraisal: Total QALYs for population not treated with new intervention (undiscounted)	QALYs expected without the disease	QALY loss: Proportional	QALY loss: Absolute
Column A	B	C	E	F	G (=Column E & Expected QALYs worksheet)	H (=Column I / Column G)	I (=Column G - Column F)
Advanced breast cancer (TA 34)	C50	Malignant neoplasm of breast	59	0.57	21.2	97%	21
Metastatic melanoma (TA266)	C43	Malignant melanoma of skin	56	0.50	23.8	96%	23
Non small-cell lung cancer (TA 192)	C34	Malignant neoplasm of bronchus and lung	60	1.00	20.5	95%	20
Metastatic renal cell carcinoma (TA 178)	C64	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis	60	1.24	20.5	94%	19
Metastatic colorectal cancer (TA212)	C18	Malignant neoplasm of colon	60	1.31	20.5	94%	19
Metastatic prostate cancer (TA259)	C61	[prostate cancer]	69	0.89	14.0	94%	13
Myelofibrosis (TA289)	C94	Other leukaemias of specified cell type	65	1.49	16.7	91%	15
Multiple myeloma 2nd subsequent relapse (TA 171)	C90	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms	62	1.72	18.9	91%	17
Relapsing remitting multiple sclerosis (TA 254)	G35	Multiple sclerosis	37	3.99	40.7	90%	37
Chronic myeloid leukemia (TA 241)	C92	Myeloid leukaemia	56	2.45	23.8	90%	21
Metastatic ovarian cancer (TA284)	C56	[malignant neoplasm of ovary]	59	3.49	21.2	84%	18
Alzheimer's disease (TA 217)	G30	Alzheimer's disease	77	1.58	8.7	82%	7
Severe rheumatoid arthritis (TA225)	M06	Other rheumatoid arthritis	50	5.36	28.6	81%	23
Idiopathic pulmonary fibrosis (TA282)	J84	Other interstitial pulmonary diseases	66	3.13	16.0	80%	13
Chronic heart failure (TA 267)	I50	Heart failure	60	4.16	20.5	80%	16
Psoriatic arthritis (TA226)	M06	Other rheumatoid arthritis	47	7.01	31.1	77%	24
Stroke (TA 264)	I63	Cerebral infarction	68	3.71	14.6	75%	11
Peripheral arterial disease (TA223)	I73	Other peripheral vascular diseases	66	5.09	16.0	68%	11
Diabetic macular oedema (TA301)	H35	Other retinal disorders	63	7.16	16.2	61%	11
Acute coronary syndromes (TA236)	I20	Angina pectoris	70	6.26	13.3	53%	7
Diabetes type II (TA288)	E11	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	58	11.28	22.0	49%	11
Osteosarcoma (TA 235)	C40	Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs	14	33.11	64.2	48%	31
Atrial fibrillation (TA275)	I48	Atrial fibrillation and flutter	74	5.70	10.6	46%	5
Hepatitis C (TA252)	B17	Other acute viral hepatitis	44	22.92	33.9	32%	11
Severe asthma (TA 278)	J45	Asthma	43	25.31	34.8	27%	10
PTE (treatment / sec prev) (TA261)	I82	Other venous embolism and thrombosis	56	20.56	23.6	13%	3
Average displaced treatment in NHS	disp!					9%	2.1

IMPORTANT NOTE FOR INTERPRETATION
The conditions listed in this table have been selected based on the Technology Appraisal guidance produced by NICE over the past years, for which an estimate of the (undiscounted)expected QALYs gained without the new intervention was available from the economic model.
These should therefore be seen as ILLUSTRATIVE ONLY, and will not be used in future technology appraisals solely on the basis of inclusion in this table.
The QALYs gained without the new intervention have mostly been taken directly from the models produced by the company in their original submission. These do not include those that have resulted from exploratory analyses by ERGs, or those that relate directly to the most plausible ICER accepted by Committee.The average age of people with the condition at the time of consideration of the new intervention has also been taken from the economic model, where available.
QALYs expected without the disease are taken from life tables provided by the Department of Health, applying an age-corrected utility, and uprating for survival expectations over time.
THE EXCEL FILE AND SUPPORTING SPREADSHEETS ARE AVAILABLE ON REQUEST FROM tom.woodward@nice.org.uk AFTER SIGNING THE RELEVANT UNDERTAKING

Hepatitis C (TA252)	B17	Other acute viral hepatitis	44	22.92	33.9	32%	11



El tiempo…NO es oro

El oro no vale nada

El tiempo es vida

J.L. Sampedro (1917-2013)